

SKRÓCONA INSTRUKCJA UPRAWY NA NASIONA ŻYCICY MIESZAŃCOWEJ MEGA

Produkcja nasienna – życica mieszańcowa forma ozima

- **Duży potencjał plonu nasion** 15 - 17 dt/ha.
- **Termin dojrzewania** – w połowie lipca, przed zniwami zbożowymi.
- **Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym** w okresie późnoletnim od 25 sierpnia do 10 września.
- **Norma wysiewu** 18 – 20 kg/ha, **rozstawa rzędów** 12,5 cm, **głębokość siewu** 1-2 cm.
- **Nawożenie mineralne:** nawozy azotowe w formie szybko działającej: równomierny wysiew nawozów wpływa korzystnie na wyrównane dojrzewanie nasion.
 - **Przedsewnie pełne nawożenie:** N: 30kg/ha, P₂O₅: 80kg/ha, K₂O: 100–120 kg/ha.
 - **Wiosną pogłównie w okresie ruszenia wegetacji:** N: 60 kg/ha. **W okresie suszy wiosennej dawkę należy podzielić na 2 : 40kg/ha oraz po 2-3 tygodniach 20kg/ha.**
 - Dokarmianie dolistne mocznikiem – roztwór 5-10% + siarczan magnezu 3kg/ha – 2-4 razy w okresie od ruszenia wegetacji do końca kłoszenia. Zabieg ten można połączyć z innymi opryskami np. grzybowymi lub owadobójczymi.
 - Po zbiorze nasion i przykoszeniu plantacji: pełne nawożenie mineralne
 - Po wystąpieniu późno letniego odrostu trawy - po skoszeniu należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 30 kg N/ha (najpóźniej do 30 IX). Zbyt późne zastosowanie azotu spowodować może zbyt duży przyrost masy zielonej co wpłynąć może na słabe przezimowanie roślin.
- **Niszczanie chwastów dwuliściennych środkami:**
 - *Starane 333 EC* (fluroksypyr - 333 g) – 0,54 l/ha.
- **Niszczanie chwastów jednoliściennych** (miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna - kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną środkami:
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Zalecana ochrona chemiczna przeciw chorobom grzybowym.** Nie stosować podczas kwitnienia roślin.
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Możliwość zastosowania antywylegacza** w fazie początku strzelania w źdźbło (pierwszego wyczuwalnego kolanka)
 - *Optimus 175 EC, Optimus Super 175 EC* (trineksapak etylu 175g/l) 1,1 l/ha
- **Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu**
 - *Obecnie brak zarejestrowanych środków.*
- **Zbiór jednofazowy kombajnem** przy pełnej dojrzałości nasion.
- **Zbiór nasion dwufazowy.**
 - Koszenie na pokosy 1-2 dni od początku osypywania się nasion.
 - Optymalna wilgotność nasion podczas kładzenia na pokos 43-48% (z każdym dniem wilgotność nasion spada o około 2-3 %).

SKRÓCONA INSTRUKCJA UPRAWY NA NASIONA ŻYCICY MIESZAŃCOWEJ MEGA

- Młócenie po 4-8 dniach (w zależności od pogody).
- **Zalecany okres użytkowania plantacji** nasiennych 2 lata.

!! UWAGA !!

- ⇒ **M. Szczepanek, Z. Skinder za Tucholska i Bartz [1983] wykazali, że u Życicy trwałej zdolność kiełkowania po desykcji zmniejszyła się o 11,2% wskutek udziału nasion anormalnie kiełkujących.**
- ⇒ Nawożenie mineralne bezpośrednio po zbiorze nasion? Jest to jeden z podstawowych warunków otrzymania dobrego plonu nasion w roku następnym. Po zbiorze rośliny powinny odrosnąć i wytworzyć jak największą liczbę pędów bocznych. Ponadto potas wpływa korzystnie na gromadzenie cukrów zapasowych w węzle krzewienia co przyczynia się do lepszego zimowania roślin.
- ⇒ Trawy dojrzewają nie równomiernie. Dojrzewanie zaczyna się od szczytów kłosów czy wiech i przesuwa się ku dołowi. Na części pola mniej zasobnej w wodę mogą dojrzewać o dzień lub dwa wcześniej, natomiast na polu położonym niżej mogą dojrzewać później. Różnice w dojrzewaniu obserwujemy również po niedokładnym rozsianiu nawozów azotowych oraz gdy plantacja wylegnie.



Zbiór nasion w odpowiednim terminie



Zbyt późny zbiór nasion (część nasion osypanych w międzyrzędziach)